

古代经典名方——仲景经方关键信息及产品形式一览表

第一批 100 首古代经典名方中，计有仲景方 28 首；第二批 93 首古代经典名方（汉族医药类）中，计有仲景方 36 首。合计仲景经方 64 首。

2023 年 5 月，国家中医药管理局和国家药品监督管理局联合发布 7 首儿科方剂的古代经典名方关键信息表，具体是异功散、泻黄散、白术散、消乳丸、苏葶丸、人参五味子汤、清宁散 7 首，加之第二批公布之名方，亦可算作 100 首数量。



第一批古代经典名方

(一) 桃核承气汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	桃仁五十个(去皮尖), 大黄四两, 桂枝二两(去皮), 甘草二两(炙), 芒硝二两。 上五味, 以水七升, 煮取二升半, 去滓, 内芒硝, 更上火, 微沸下火, 先食温服五合, 日三服。	桃仁	蔷薇科植物山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子	焯桃仁	13.50g	上五味, 加水 1400ml, 煮取 500ml, 去药渣后加入芒硝, 再加热至沸腾。饭前温服 100ml, 日 3 次。	【功效】逐瘀泻热。 【主治】下焦蓄血证。症见少腹急结, 小便自利, 甚则烦躁谵语, 神志如狂, 至夜发热, 以及血瘀经闭, 痛经, 脉沉实而涩者。
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	55.20g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		芒硝	硫酸盐类矿物芒硝族芒硝, 经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	生品	27.60g		
备注	<p>1. 据原方中煎煮法“煮取二升半”“温服五合”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/5。故本方每次的服药量为: 桃仁 2.70g, 大黄 11.04g, 桂枝 5.52g, 甘草 5.52g, 芒硝 5.52g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2. 炒甘草建议参考《中华人民共和国药典》2020 年版中清炒法, “将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 炒至微黄”。</p>						

(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)

产品形式(生产厂家): 核桃承气汤丸(安徽亳州产等); 核桃承气汤药包等。

(二) 芍药甘草汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	白芍药、甘草各四两(炙)。 上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall 的干燥根	生品	55.20g	上二味,以水600ml,煮取300ml,温服,日2次。	【功效】 益阴 养血,缓急止痛。 【主治】 阴血不足,筋脉失养所致 挛急疼痛诸证,症 见腿脚挛急,腹中 疼痛。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	55.20g		
备注	<p>1.据原方中煎煮法“煮取一升五合”“分温再服”,可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为:白芍 27.60g,甘草 27.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-2 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草建议参考《中华人民共和国药典》2020 年版中清炒法,“将甘草原药材除去杂质,洗净,润透,切厚片,炒至微黄”。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p> <p>产品形式(生产厂家): 芍药甘草汤丸(安徽亳州产等); 芍药甘草汤颗粒(香港同济大药房产); 芍药甘草汤药包(倪海厦</p>						

	旗舰店)；芍药甘草汤药包等。
--	----------------

(三) 半夏泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	半夏半升(洗)，黄芩、干姜、人参、甘草(炙)各三两，黄连一两，大枣十二枚(擘)。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g	上七味，以水2000ml，煮取1200ml，去药渣，再浓缩至600ml，温服200ml，日3次。	【功效】寒热平调，散结除痞。 【主治】寒热互结之痞证。症见心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔腻而微黄。
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	41.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	41.40g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	13.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		

备注	<p>1.据原方中煎煮法“煎取三升，温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：半夏 11.50g，黄芩 13.80g，干姜 13.80g，人参 13.80g，甘草 13.80g，黄连 4.60g，大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点， 日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及 临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草建议参考《中华人民共和国药典》2020 年版中清炒法，“将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，炒至微黄”。</p> <p style="color: blue;">（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p style="color: red;">产品形式（生产厂家）：半夏泻心汤丸；半夏泻心汤打粉药包，免煮直泡；半夏泻心汤药包等。</p>
----	--

（四）真武汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	茯苓、芍药、生姜（切）各三两，白术二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	41.40g	上五味，以水 1600ml，煮取 600ml，去药渣，每次温服 140ml，日 3 次。	【功能】 温阳利水。 【主治】阳虚水泛证。症见小便不利，畏寒肢冷，头目眩晕，心下悸动不宁，身体筋肉瞤动，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛泄泻；或 呕逆咳
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	41.40g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	27.60g		

		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	15.00g		喘。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服七合”，可知本方每服量为煎出总量的 7/30。故本方每次的服药量为：茯苓 9.66g，白芍 9.66g，生姜 9.66g，白术 6.44g，附子 3.50g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：真武汤丸（山东康纳医药科技有限公司等）；真武汤药包等。</p>						

（五）黄芪桂枝五物汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》 (汉·张仲景)	黄芪三两，芍药三两，桂枝三两，生姜六两，大枣十二枚。 上五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日三服。	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	41.40g	上五味，以水 1200ml，煮取 400ml，温服 140ml，日 3 次。	【功效】益气温经，和血通痹。 【主治】血痹证。症见肌肤麻木不仁，微恶风寒，舌淡苔白，脉微涩而紧。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		

		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	82.80g	
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g	
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升，温服七合”，可知本方每服量为煎出总量的 7/20。故本方每次的服药量为：黄芪 14.49g，白芍 14.49g，桂枝 14.49g，生姜 28.98g，大枣 12.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：黄芪桂枝五物汤药包；黄芪桂枝五物汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。</p>					

（六）瓜蒌薤白半夏汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》 (汉·张仲景)	瓜蒌实一枚，薤白三两，半夏半斤，白酒一斗。 上四味，同煮，取四升，温服一升，日三服。	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 的干燥成熟果实	生品	60.00g	加入黄酒 2000ml，煎至 800ml， 温服 200ml，日 3 次。	【功效】通阳散结，祛痰宽胸。 【主治】胸痹痰浊壅塞证。症见胸痛彻背，不能安卧，喘息咳嗽，短气者。
		薤白	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge. 的干燥鳞茎	生品	41.40g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		黄酒	参考国家标准 GB/T 13662-2018 传统型黄酒（以糯米 <i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> 为原料）		2000ml		

备注	<p>据原方中煎煮法“取四升，温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/4。故本方每次的服药量为：瓜蒌 15.00g，薤白 10.35g，半夏 8.63g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p style="color: blue;">（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p style="color: red;">产品形式（生产厂家）：瓜蒌薤白半夏汤打粉，瓜蒌薤白半夏汤药包等。</p>
----	---

(七) 大建中汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》 (汉·张仲景)	蜀椒二合（去汗），干姜四两，人参二两。 上三味，以水四升，煮取二升，去滓，内胶饴一升，微火煮取一升半，分温再服；如一炊顷，可饮粥二升，后更服。当一日食糜，温覆之。	花椒	芸香科植物花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮	炒花椒	9.00g	上三味药，以水 800ml，煮取 400ml，去药渣，加入饴糖 200ml，小火煮取 300ml，每次温服 150ml，日 2 次。	【功效】温中补虚，降逆止痛。 【主治】中阳衰弱，阴寒内盛证。症见心胸中大寒痛，呕不能食，腹中寒，甚则可上冲皮起如有形，腹痛拒按，痛无定处，或腹中漉漉有声，
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	55.20g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		

		胶饴	参考国家标准 GB/T20883-2017 麦芽糖 (以糯米 <i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> 、大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L. 为原料)		200ml	手足厥冷，舌质淡，苔白滑，脉细紧，或脉沉伏而迟。
--	--	----	---	--	-------	--------------------------

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》(汉·张仲景)	麦门冬七升，半夏一升，人参二两，甘草二两，粳米三合，大枣十二枚。 上六味，以水一斗二升，煮取六升，温服	麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	212.00g	上六味药，以水2400ml，煮取1200ml，	【功效】滋养肺胃，降逆下气。
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	69.00g		【主治】虚热肺痿或胃阴不足证。症见咳唾涎沫，短气喘促，或呃逆呕
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“微火煮取一升半，分温再服”，可知本方煎出总量为 2 次服量。故本方每次的服药量为：花椒 4.50g，干姜 27.60g，人参 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p> <p>产品形式(生产厂家)：大建中汤丸(安徽国丰堂生物科技有限公司等)；大建中汤药粉(泰安菩茵堂生物科技有限公司等)；大建中汤药包等。</p>						

(八) 麦门冬汤

一升，日三夜一服。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	27.60g	每次温服 200ml, 日 3 夜 1 次。	吐，咽干口燥，舌干红少苔，脉虚数。
	粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L.subsp. <i>japonica</i> Kato 的干燥成熟种仁	生品	52.80g		
	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>1.麦门冬汤在《古代经典名方目录(第一批)》的处方出处中，麦冬为七升，麦冬一升约为 106g，远超常规用量。考证多个版本的《金匱要略》以及记载仲景方剂的《外台秘要》、《千金方》等书，麦门冬汤中的麦冬剂量均有所不同。《外台秘要》所载麦门冬汤中麦冬为二升，更接近临床常用量，领域专家亦推荐本方中麦冬应取二升为宜。故建议本方中麦冬按二升进行折算，折合约 212g。</p> <p>2.据原方中煎服法“煮取六升，温服一升”，可知本方每服剂量为煎出总量的 1/6，故本方每次的服药量为：麦冬 35.33g，半夏 11.50g，人参 4.60g，甘草 4.60g，粳米 8.80g，大枣 6.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-4 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p> <p>产品形式(生产厂家)：麦门冬汤药包等；麦门冬汤颗粒(日本松浦制药株式会社等)；麦门冬汤丸(山东康纳医药科技有限公司等)。</p>					

(九) 苓桂术甘汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·	茯苓四两，桂枝、白术各三两，甘草	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	55.20g	上四味，以水 1200 毫	【功效】温阳化饮，健脾利

张仲景)	二两。 上四味，以水六升，煮取三升，分温三服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia Presl</i> 的干燥嫩枝	生品	41.40g	升煎煮，煮取 600 毫升，分三次温服。	湿。 【主治】中阳不足之痰饮。症见胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑。
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala Koidz.</i> 的干燥根茎	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis Fisch.</i> 干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，分温三服”，可知本方可知本方每服剂量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：茯苓 18.40g，桂枝 13.80g、白术 18.30g，甘草 9.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上列剂量系度量衡原方量折算，若与当今主流用量严重不符，在保证原方比例不变的情况下，结合安全性评价结果确定日服用量。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p> <p>产品形式(生产厂家)：苓桂术甘汤药材包；苓桂术甘汤丸(台湾汉方医药有限公司，安徽泽宸倍健生物科技有限公司等)；苓桂术甘汤提取物(日本津村汉方株式会社等)。</p>						

(十)竹叶石膏汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	竹叶二把，石膏一斤，半夏半升(洗)，麦门冬一升(去心)，	竹叶	禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile Brongn.</i> 的干燥茎叶	生品	27.60g	上七味，除去粳米的六味以 2000ml 水，煮取	【功效】清热生津，益气和胃。 【主治】伤寒、温病、暑病余热未清，
		石膏	硫酸盐类矿物硬石膏族石膏 <i>Gypsum Fibrosum</i>	生品	220.00g		

<p>人参二两，甘草二两（炙），粳米半斤。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟，汤成去米，温服一升，日三服。</p>	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g	<p>1200ml，去渣，加入粳米，汤成去米，温服用200ml，一日服三。</p> <p>气津两伤证。症见身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，或虚烦不寐，舌红苔少，脉虚数。</p>
	麦门冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	106.00g	
	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g	
	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g	
	粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L.subsp. <i>japonica</i> Kato 的干燥成熟种仁	生品	110.00g	
备注	<p>1.麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如《中华人民共和国药典》1963年版麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自《中华人民共和国药典》1977年版起不再要求去心。当前麦冬不同产地生产方式有较大区别，不同栽培年限所致性状、气味及内在成分含量均有差异，品质差异较大，栽培年限过短者中柱细小，有鉴于此，建议参考《浙江省中药炮制规范》2015年版所规定的浙麦冬饮片规格入药。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煮取六升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/6。故本方每次的服药量为：竹叶 4.48g，石膏 36.67g，半夏 5.75g，麦冬 17.67g，人参 4.60g，甘草 4.60g，粳米 18.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：竹叶石膏汤药包；竹叶石膏汤丸；竹叶石膏汤茶包；竹叶石膏汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司）。</p>				

(十一)麻黄汤

基本信息	现代对应情况
------	--------

出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	麻黄三两(去节), 桂枝二两(去皮), 甘草一两(炙), 杏仁七十个(去皮尖)。上四味, 以水九升, 先煮麻黄, 减二升, 去上沫, 内诸药, 煮取二升半, 去滓, 温服八合, 覆取微似汗, 不须啜粥, 余如桂枝法将息。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica Stapf</i> 的干燥草质茎	生品	41.40g	上四味, 以水1800mL, 先煮麻黄至1400mL, 去沫, 加入余药, 煮取500mL, 去滓, 温服160mL。	【功效】发汗解表, 宣肺平喘。 【主治】外感风寒表实证, 症见恶寒发热, 头身疼痛, 无汗而喘, 脉浮紧等。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia Presl</i> 的干燥嫩枝	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis Fisch.</i> 的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
		杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca L.</i> 的干燥成熟种子	燀苦杏仁	25.90g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升半, 去滓, 温服八合”, 可知本方每服量为煎出总量的 8/25。故本方每次的服药量为: 麻黄 13.25g, 桂枝 8.83g, 甘草 4.42g, 杏仁 8.29g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p> <p>产品形式(生产厂家): 麻黄汤药材包(九州上医好药师(湖北)大药房有限公司等); 麻黄汤中药浓缩制剂(台湾科达制药股份有限公司等)。</p>						

(十二)小承气汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《伤寒论》(汉·张仲景)	大黄四两(酒洗), 厚朴二两(炙, 去皮), 枳实三枚(大者, 炙)。 上三味, 以水四升, 煮取一升二合, 去滓, 分温二服。初服汤当更衣, 不尔者, 尽饮之, 若更衣者, 勿服之。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	酒大黄	55.20g	上三味, 以水 800ml, 煮取 240ml, 去药渣, 分两次温服。	【功效】 轻下热结。 【主治】 阳明腑实轻证。症见谵语潮热, 大便秘结, 胸腹痞满, 或痢疾初起, 腹中胀痛, 里急后重者, 舌苔老黄, 脉滑而疾。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	27.60g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥幼果	麸炒枳实	41.40g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升二合, 去滓, 分温二服”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为: 大黄 27.60g, 厚朴 13.80g, 枳实 20.70g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-2 次, 根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p> <p>产品形式(生产厂家): 小承气汤丸(山东康纳医药科技有限公司、安徽九里香生物科技有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司等); 小承气汤药材包; 小承气汤浓缩固体粉末; 小承气汤茶包等。</p>						

(十三)当归四逆汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·	当归三两, 桂枝三两(去皮), 芍药三两,	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	41.40g	上七味, 加水	【功效】 温经散寒, 养血通脉。

张仲景)	细辛三两，甘草二两（炙），通草二两，大枣二十五枚（擘）。上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g	1600ml，煮取600ml，去药渣，每次温服200ml，日三服。	【主治】血虚寒厥证。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		通草	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥藤茎	生品	27.60g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	75.00g		
备注	<p>1.汉代通草为今木通，且历代为多基原，优先推荐历代主流基原木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：当归 13.80g，桂枝 13.80g，白芍 13.80g，细辛 13.80g，甘草 9.20g，木通 9.20g，大枣 25.00g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)

产品形式(生产厂家): 当归四逆汤药材包; 当归四逆汤丸(安徽国丰堂生物科技有限公司等); 当归四逆汤颗粒(台湾汉方医药有限公司等)。

(十四)桂枝芍药知母汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张仲景)	桂枝四两, 芍药三两, 甘草二两, 麻黄二两, 生姜五两, 白术五两, 知母四两, 防风四两, 附子二两(炮)。上九味, 以水七升, 煮取二升, 温服七合, 日三服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	55.20g	上九味, 加水 1400ml, 煮取 400ml, 温服 140ml, 日 3 次。	【功效】祛风逐湿, 温经散寒, 滋阴清热。 【主治】风湿历节。症见诸肢节疼痛, 身体瘦弱, 脚肿麻木, 头眩短气, 恶心欲吐, 舌淡苔白, 脉沉细。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	27.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	69.00g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	69.00g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎	生品	55.20g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	55.20g		

	附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	27.60g	
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升”“温服七合”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 7/20。故本方每次的服药量为：桂枝 19.32g，白芍 14.49g，甘草 9.66g，麻黄 9.66g，生姜 24.15g，白术 24.15g，知母 19.32g，防风 19.32g，附子 9.66g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：桂枝芍药知母汤颗粒（台湾汉方医药有限公司等）；桂枝芍药知母丸（保定赛行阿胶有限公司等）；桂枝芍药知母汤药材包；桂枝芍药知母汤代煎药；桂枝芍药知母汤药材粉等。</p>				

(十五)半夏厚朴汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	半夏一升，厚朴三两，茯苓四两，生姜五两，干苏叶二两。 上五味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	69.00g	上五味，以水 1400ml，煎至 800ml，温服 200ml，日 3 次、夜 1 次服。	【功效】行气散结，降逆化痰。 【主治】梅核气气郁痰阻证。症见咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸胁满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	41.40g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	55.20g		

	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	69.00g	
	干苏叶	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶	生品	27.60g	
备注	<p>1.原方明确为紫苏叶，因此推荐其药用部位为叶。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煮取四升”“温服一升”“分温四服，日三夜一服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/4。故本方每次的服药量为：半夏 17.25g，厚朴 10.35g，茯苓 13.80g，生姜 17.25g，紫苏叶 6.90g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~4 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：半夏厚朴汤丸（郑州林诺实业有限公司、远草堂旗舰店、安徽茗草济药业有限公司等）；半夏厚朴汤药材包；半夏厚朴汤茶包；半夏厚朴汤药材粉；半夏厚朴汤浓缩速溶粉末（远志百草厅等）；半夏厚朴汤颗粒（日本 TSUMURA\$CO.株式会社津村等）。</p>				

(十六)百合地黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	百合七枚(擘),生地黄汁一升。 上以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，	百合	百合科植物百合 <i>Lilium brownii</i> F.E.Brown var. <i>viridulum</i> Baker 的新鲜鳞叶	鲜品	245.00g	鲜百合以水浸渍一夜，泡出白沫后捞出，以 400ml 泉水，煮取	【功效】养阴清热，补益心肺。 【主治】治百合病之心肺阴虚内热证。症见神志恍惚，意欲饮食复不能食，时而欲

	煎取一升，去滓，内地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病，勿更服，大便当如漆。	生地黄汁	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的新鲜块根	鲜品榨汁	200ml	200ml，去药渣，加入生地黄汁，煮取300ml，分两次温服。	食，时而恶食；沉默寡言，欲卧不能卧，欲行不能行，如有神灵；如寒无寒，如热无热，口苦，小便赤，舌红少苔，脉微细。
备注	<p>1.生地黄汁以地黄鲜品洗净后不加水等辅料，直接榨汁而成。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煎取一升五合，分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：百合 122.50g，地黄汁 100mL，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：百合地黄汤茶包；百合地黄汤中药材；百合地黄汤丸（徽万草堂生物科技有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司、福建省聚华韵生物科技有限公司等）；百合地黄汤浓缩固体粉末（远志百草厅等）。</p>						

(十七)枳实薤白桂枝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》（汉·张仲景）	枳实四枚，厚朴四两，薤白半斤，桂枝一两，瓜蒌实一枚（捣）。上五味，以水五升，先煮枳实、厚朴，	枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	生品	55.20g	上五味药，以水1000ml，先煮枳实、厚朴，煮取	【功效】行气祛痰，通阳散结。 【主治】胸痹，胸阳不振、痰气互结证。症见胸满而痛，甚或胸
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	55.20g		

取二升，去滓，内诸药，煮数沸，分温三服。	薤白	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge. 的干燥鳞茎	生品	110.00g	400ml，去渣，入余药，煮数沸，分3次温服。	痛彻背，喘息咳嗽，短气，气从胁下冲逆，上攻心胸，舌苔白腻，脉沉弦或紧。
	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	13.80g		
	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii Maxim.</i> 的干燥成熟果实	生品	60.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：枳实 18.40g，厚朴 18.40g，薤白 36.67g，桂枝 4.60g，瓜蒌 20.00g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》）</p> <p>产品形式（生产厂家）：枳实薤白桂枝汤药材包；枳实薤白桂枝汤代煎药；枳实薤白桂枝汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。</p>					

(十八)厚朴麻黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》（汉·张仲景）	厚朴五两，麻黄四两，石膏如鸡子大，杏仁半升，半夏半升，干姜二两，细辛二两，小麦一升，五味子半升。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	69.00g	上九味，以水 2400ml，先煮小麦至熟，去渣，加入余药，煮取	【功效】宣肺化饮，清肺化痰，降气平喘。 【主治】表寒里饮证。症见咳嗽痰多，喘
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	55.20g		

上九味，以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，内诸药，煮取三升，温服一升，日三服。	石膏	硫酸盐类矿物硬石膏族石膏 <i>Gypsum Fibrosum</i> ，主含含水硫酸钙 (CaSO ₄ ·2H ₂ O)	生品	90.00g	600ml，温服 200ml，日 3 服。	而胸满，不能平卧，咽喉不利，喉中有哮鸣音，舌苔滑，脉浮或滑。
	杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	燂苦杏仁	57.00g		
	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
	干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	27.60g		
	细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
	小麦	禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L. 的干燥果实	生品	140.00g		
	五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	生品	37.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：厚朴 23.00g，麻黄 18.40g，石膏 30.00g，苦杏仁 19.00g，半夏 11.50g，干姜 9.20g，细辛 9.20g，小麦 46.67g，五味子 12.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(以上信息来源于国家中医药管理局《古代经典名方关键信息表》)</p>					

产品形式（生产厂家）：厚朴麻黄汤药材包（奇冠大药房旗舰店等）。

（十九）旋覆代赭汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	旋覆花三两，人参二两，生姜五两，代赭一两，甘草三两（炙），半夏半升（洗），大枣十二枚（擘）。 上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	旋覆花	菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb.或欧亚旋覆花 <i>Inula Britannica</i> L.的干燥头状花序	生品	46.80g	上七味，以水2000ml，煮取1200ml，去滓，再煎取600ml，温服200ml，一天服三次，一次200ml。	【功效】降逆化痰，益气和胃。 【主治】胃气虚弱，痰浊内阻，噎气反胃，气逆不降。主要用于治疗止呃、止吐，胃溃疡、胃炎、眩晕症等。
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	31.20g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	78.00g		
		代赭	三方晶系氧化物类矿物刚玉族赤铁矿 <i>Haematium</i> ，主含三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ）	生品	15.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	46.80g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	十二枚 (约 48.00g)		
备注	据原方中煎煮法“再煎取三升，温服一升，日三服”，可知本方每服量为煎出总量的1/3。故本方每次的服药量为：旋覆花 15.60g，人参 10.40g，生姜 26.00g，代赭 5.20g，甘草 15.60g，半夏 11.50g，大枣 16.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。						

上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。

（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）

产品形式（生产厂家）：旋覆代赭汤药包（倪海厦旗舰店等）；旋覆代赭汤打粉制散等；旋覆代赭汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。

(二十)吴茱萸汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	吴茱萸一升(洗)，人参三两，生姜六两(切)，大枣十二枚(擘)。上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。	吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实	生品	200ml (约 70g)	上四味，以水 1400ml，煮取 400ml，去药渣，温服 140ml，一日三服。	【功效】温中补虚，降逆止呕。 【主治】胃中虚寒，食谷欲呕，胸膈满闷，或冒腕痛，吞酸嘈杂；厥阴头痛，干呕吐利，手足厥冷，烦躁欲死等症。用于治疗呕吐，呃逆，胃、十二指肠溃疡，肠炎，胆囊炎，肝炎，美尼尔氏综合征，神经官能症，头痛，痛经，不孕，双眼部疾患者等。
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	93.60g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12 枚 (约 48.00g)		

备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升，去滓，温服七合，日三服”，可知本方每服用量为煎出总量的 7/20。故本方每次的服药量为：吴茱萸 24.50g，人参 16.38g，生姜 32.76g，大枣 16.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：吴茱萸汤丸（郑州林诺实业有限公司、安徽鸣隆药业有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司等）；吴茱萸汤药材包；吴茱萸汤茶包（安徽省林兴堂药业科技有限公司等）。</p>
----	---

(廿一)猪苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	猪苓(去皮)、茯苓、泽泻、阿胶、滑石(碎)各一两。 上五味,以水四升,先煮四味,取二升,去滓,内阿胶烱消,温服七合,日三服。	猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	生品去皮	15.60g	上五味,以水 800ml 煮除阿胶的四味,煮取 400ml,去药渣,加入阿胶至融化,温服 140ml,一日 3 服。	【功效】利水清热滋阴。 【主治】水热互结,内热伤阴所致的小便不利,渴欲饮水,心烦不得眠,咳嗽,恶心呕吐,下利粘滞等症,舌红苔白或微黄,脉细数。又治血淋,小便涩痛,点滴难出,小腹满痛者。用于治疗尿路结石,肾
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	15.60g		
		泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	生品	15.60g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶		15.60g		

	滑石	硅酸盐类矿物滑石族滑石 <i>Talcum; Pulvis Talci</i> ，主含含水硅酸镁 $[Mg_3(Si_4O_{10})(OH)_2]$	生品	15.60g	积水，特发性水肿流行性出血热休克期，急性膀胱炎，产后癃闭。
备注	<p>据原方中煎煮法“取二升，去滓，内阿胶烱消，温服七合，日三服”，可知本方每服用量为煎出总量的 7/20。故本方每次的服药量为：猪苓 5.46g，茯苓 5.46g，泽泻 5.46g，阿胶 5.46g，滑石 5.46g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：猪苓汤药材包；猪苓汤丸（安徽省福广药业有限公司、亳州市林兴堂药业科技有限公司等）。</p>				

(廿二)甘草泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	甘草四两(炙)，黄芩三两，干姜三两，大枣十二枚(擘)，半夏半升(洗)，黄连一两。 上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	62.40g	上六味，以水 2000ml，煮取 1200ml，去药渣，再煎取 600ml，温服 200ml，一日 3 服。	【功效】益气和胃，消痞止呕。 【主治】伤寒中风，医反下之，以致胃气虚弱，其人下利日数十行，完谷不化，腹中雷鸣，
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	46.80g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	46.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12 枚 (约 48.00g)		

升，日三服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g	心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。
	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	15.60g	
备注	<p>据原方中煎煮法“再煎取三升，温服一升，日三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：甘草 20.80g，黄芩 15.60g，干姜 15.60g，大枣 16.00g，半夏 11.50g，黄连 5.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：甘草泻心汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司、安徽鸣隆药业有限公司等）；甘草泻心汤药材包；甘草泻心汤茶包；甘草泻心汤药材粉末等。</p>				

(廿三)黄连汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	黄连三两，甘草三两（炙），干姜三两，桂枝三两（去皮），人参二两，半夏半升（洗），大枣十二枚	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	46.80g	上七味，以水 2000ml，煮取 1200ml，去药渣，温服，	【功效】平调寒热，和胃降逆。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	46.80g		【主治】伤寒，胸中有热，胃

	（擘）。 上七味，以水一斗， 煮取六升，去滓，温 服，昼三服夜二服。	干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥 根茎	生品	46.80g	白日服三 次，夜间服2 次。	中有邪气，腹 中痛，欲呕吐 者。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的 干燥嫩枝	生品去皮	46.80g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	31.20g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥 成熟果实	生品	12 枚 (约 48.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取六升，去滓，温服，昼三服夜二服”，可知本方每服剂量为煎出总量的 1/5。故本方每次的服药量为：黄连 9.36g，甘草 9.36g，干姜 9.36g，桂枝 9.36g，人参 6.24g，半夏 6.90g，大枣 9.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-5 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：黄连汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司等）；黄连汤药材包（江苏奇冠药店有限公司等）。</p>						

(廿四)附子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《伤寒论》(汉·张仲景)	附子二枚(炮,去皮,破八片),茯苓三两,人参二两,白术四两,芍药三两。 上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。	附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	2枚 (约 30.00g)	上五味,以水 1600ml,煮取 600ml,去药渣,温服 200ml,一日 3 服。	【功效】温阳利水,祛寒化湿。 【主治】阳虚寒邪内侵,身体骨节疼痛。用于治疗全身痛、关节痛、腰痛,舌血管神经性水肿,心绞痛,腹痛、腹泻、呕吐,眩晕,以及流产、早产及其它病证。
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	46.80g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	31.20g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	62.40g		
		芍药(白芍)	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	46.80g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升,去滓,温服一升,日三服”,可知本方煎出总量为 3 次剂量。故本方每次的服药量为:附子 10.00g,茯苓 15.60g 人参 10.40g,白术 20.80g,芍药(白芍) 15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-3 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家):附子汤茶包(倪海厦旗舰店等);附子汤药材包等。</p>						

(廿五)泽泻汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《金匱要略》（汉·张仲景）	泽泻五两，白术二两。 上二味，以水二升，煮取一升，分温再服。	泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep. 或 泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	生品	78.00g	上二味，以水 400ml，煮取 200ml，分两次温服。	【功效】健脾，利水，除饮。 【主治】心下有支饮，使清阳不升，浊阴上犯，头目眩晕，心悸呕吐、耳鸣等证。主要用于治疗眩晕的治疗，如美尼尔氏综合征及中耳积液，高脂血症，水肿等。
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升，分温再服”，可知本方煎出总量为 2 次服量。故本方每次的服药量为：泽泻 39.00g，白术 15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：泽泻汤茶包等。</p>						

(廿六)橘皮竹茹汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	橘皮二升，竹茹二升，大枣三十枚，生姜半斤，甘草五两，人参一两。 上六味，以水一斗，煮取三升，温服一	陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	400ml (约 100.00g)	上六味，以水 2000ml，煮取 600ml，温服 200ml，一	【功效】理气降逆，益胃清热。 【主治】久病体弱或吐下后胃虚有热，
		竹茹	禾本科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>Pubescens</i> P.F.Li 或淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i>	生品	400ml (约 30.00g)		

升，日三服。		<i>(Mitf.)Stapf ex Rendle</i> 的茎秆的干燥中间层			日三服。	气逆不降，呃逆或呕吐，舌嫩红，脉虚数。
	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	30 枚 (约 120.00g)		
	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	125.00g		
	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	78.00g		
	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	15.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，温服一升，日三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：陈皮 33.33g，竹茹 10.00g，大枣 40.00g，生姜 41.67g，甘草 26.00g，人参 5.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家)：橘皮竹茹汤茶包；橘皮竹茹汤丸(亳州市林兴堂药业科技有限公司等)；橘皮竹茹汤膏(安徽国丰堂生物科技有限公司等)。</p>					

(廿七)甘姜苓术汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《金匱要略》（汉·张仲景）	甘草、白朮各二两，干姜、茯苓各四两。上四味，以水五升，煮取三升，分温三服。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	31.20g	上四味，以水1000ml，煮取600ml，分三次温服。	【功效】暖土胜湿；补土制水，散寒渗湿；温脾化湿。 【主治】肾着。寒湿下侵，身重，腰以下冷重而痛，饮食如故，口不渴，小便自利；胞痹，小便不利，鼻出清涕者；呕吐腹泻，妊娠下肢浮肿，或老年人小便失禁，男女遗尿，妇女年久腰冷带下等，属脾阳不足而有寒湿者。
		白朮	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	31.20g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	62.40g		
		茯苓	菊科植物白朮 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	生品	62.40g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，分温三服”，可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为：甘草 10.40g，白朮 10.40g，干姜 20.80g，茯苓 20.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.6克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：甘姜苓朮汤茶包（亳州市林兴堂药业科技有限公司等）；甘姜苓朮汤丸（阜阳健诺生物科技有限公司、亳州本草芳堂饮品有限公司等）。甘姜苓朮汤药材粉末等。</p>						

(廿八)厚朴七物汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张)	厚朴半斤，甘草、大黄各三两，大枣	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia</i>	生品	125.00g	上七味，以水	【功效】解肌散寒，和胃泻肠。

仲景)	十枚，枳实五枚，桂枝二两，生姜五两。 上七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。		<i>officinalis Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.</i> 的干燥干皮、根皮及枝皮			2000ml，煮取800ml，温服160ml，一日3服。	【主治】1、太阳中风证与阳明热证相兼。症见腹满，腹痛，大便硬或不大便，饮食尚可，发热，恶风寒，汗出，脉浮数。 2、阳明肠胃寒证。症见腹满，腹痛，且以胀为主，大便不畅，舌淡，脉沉(此即寒多者加生姜至半斤)。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	46.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphusjuzuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	10枚 (约40.00g)		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥幼果	生品	5枚 (约76.00g)		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	31.20g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	78.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取四升，温服八合，日三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的1/5。故本方每次的服药量为：厚朴25.00g，甘草9.36g，大黄9.36g，大枣8.00g，枳实15.20g，桂枝6.24g，生姜15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.6克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家)：厚朴七物汤药材包；厚朴七物汤茶包；厚朴七物汤膏(安徽国丰堂生物科技有限公司等)；厚朴七物汤丸(安徽孙思邈药业有限公司等)。</p>						

第二批古代经典名方

(一)茵陈蒿汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	茵陈蒿六两，栀子十四枚（擘），大黄二两（去皮）。右三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服。	茵陈蒿	菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst.et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分	生品	93.60g	上三味，以水 2400ml，先煮茵陈，煮取 1200ml，加入剩下两味，煮取 600ml，去药渣，分 3 次服用。	【功效】清热，利湿，退黄。 【主治】湿热黄疸。一身面目俱黄，黄色鲜明，发热，无汗或但头汗出，口渴欲饮，恶心呕吐，腹微满，小便短赤，大便不爽或秘结，舌红苔黄腻，脉沉数或滑数有力。
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	14 枚 (约 21.00g)		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品去皮	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，去滓，分三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：茵陈蒿 31.20g，栀子 7.00g，大黄 10.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

	<p>(本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家)：茵陈蒿汤茶包；茵陈蒿汤药材包；茵陈蒿汤丸(山东康纳医药科技有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司等)；茵陈蒿汤浓缩速溶颗粒(远志百草厅等)；茵陈蒿汤膏(安徽国丰堂生物科技有限公司等)。</p>
--	---

(二)桂枝甘草汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	桂枝四两(去皮)，甘草二两(炙)。右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品去皮	62.40g	上二味，以水 600ml，煮取 200ml，去药渣，一次服用。	【功效】补心气，温心阳 【主治】治发汗过多，其人叉手自冒，心下悸，欲得按者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	15.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升，去滓，顿服”，可知本方煎出总量为 1 次服量。故本方每次的服药量为：桂枝 62.40g，甘草 15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家)：桂枝甘草汤药材包等。</p>						

(三)麻黄细辛附子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	麻黄二两(去节), 细辛二两,附子一枚(炮,去皮,破八片)。 右三味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica Stapf</i> 、中麻黄 <i>Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey.</i> 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina Bge.</i> 的干燥草质茎	生品	31.20g	上三味,以水2000ml,先煮麻黄,煮取1600ml,去浮沫,加入剩下药材,煮取600ml,去药渣,温服200ml,日三服。	【功效】助阳解表。 【主治】治素体阳虚,外感风寒,无汗恶寒,发热倦卧,苔白,脉反沉者。
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.</i> 、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai</i> 或华细辛 <i>Asarum sieboldii Miq.</i> 的干燥根和根茎	生品	31.20g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii Debx.</i> 的子根的加工品	黑顺片	15.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升,去滓,温服一升,日三服”,可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为:麻黄10.40g,细辛10.40g,附子5.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议1-3次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡15.6克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家):麻黄细辛附子汤药材包;麻黄细辛附子汤丸(安徽万草堂生物科技有限公司等)。</p>						

(四) 梔子柏皮汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

	法	称		格		量	
《伤寒论》（汉·张仲景）	肥梔子十五个（擘），甘草一两（炙），黄柏二两。 右三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。	梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides Ellis</i> 的干燥成熟果实	生品	15 枚 (约 22.50g)	上三味，以水 800ml，煮取 300ml，去药渣，分两次温服。	【功效】清热利湿退黄。 【主治】伤寒黄疸发热，小便黄赤，舌红苔黄，脉滑数。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	15.60g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense Schneid.</i> 的干燥树皮	生品	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升半，去滓，分温再服”，可知本方煎出总量为 2 次服量。故本方每次的服药量为：梔子 11.25g，甘草 7.80g，黄柏 15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.6 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：梔子柏皮汤药材包；梔子柏皮汤茶包；梔子柏皮汤丸（亳州市林兴堂药业科技有限公司等）。</p>						

(五)黄芩汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	黄芩三两，芍药二两，甘草二两（炙），	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	46.80g	上四味，以水 2000ml，	【功效】清热止痢，和中止痛。

张仲景)	大枣十二枚(擘)。右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。	芍药(白芍)	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	31.20g	煮取 600ml，去药渣，温服 200ml，白日再服 200ml，夜间再服 200ml。	【主治】湿热下利，腹痛泄泻，泻下急迅或泻而不爽，肛门灼热等。用于治疗痢疾、急性胃炎、肠炎、小儿腹泻、消化道型病毒性感冒，亦有用于治疗阿米巴痢疾。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphusjuzuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12 枚 (约 48.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：黄芩 15.60g，芍药(白芍) 10.40g，甘草 10.40g，大枣 16.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家)：黄芩汤丸(亳州市林兴堂药业科技有限公司等)。</p>						

(六)茯苓桂枝甘草大枣汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·	茯苓半斤，桂枝四两(去皮)，甘草二两	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	125.00g	上四味，以甘烂水 2000ml，	【功效】降肾气。

张仲景)	(炙), 大枣十五枚(擘)。右四味, 以甘烂水一斗, 先煮茯苓, 减二升, 内诸药, 煮取三升, 去滓, 温服一升, 日三服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品去皮	62.40g	先煮茯苓, 煮取 1600ml, 加入剩下药材, 煮取 600ml, 去药渣, 温服 200ml, 日三服。	【主治】治伤寒发汗后, 其人脐下悸, 欲作奔豚者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	15 枚 (约 60.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升, 去滓, 温服一升, 日三服”, 可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为: 茯苓 41.67g, 桂枝 20.80g, 甘草 10.40g, 大枣 20.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息, 系按照经典名方总剂量除以服用次数, 换算的一次煎煮剂量, 一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家): 茯苓桂枝甘草大枣汤膏(安徽国丰堂生物科技有限公司等); 茯苓桂枝甘草大枣汤药材包; 茯苓桂枝甘草大枣汤茶包等。</p>						

(七)附子泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》(汉·张仲景)	大黄二两, 黄连一两, 黄芩一两, 附子一枚(炮, 去皮, 破, 别煮取汁)。右四味, 切三味, 以	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	31.20g	上四味, 取大黄、黄连、黄芩三味以麻沸汤 400ml 浸渍,	【功效】温经回阳, 扶阳固表, 泄热消痞。 【主治】阳虚于外, 热结于
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三	生品	15.60g		

麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。		角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎			片刻后绞去药渣，加入附子榨的药汁，分两次温服。	胃。心下痞满，而复恶寒汗出，脉沉者。
	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	15.60g		
	附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	15.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“分温再服”，可知本方煎出总量为 2 次服量。故本方每次的服药量为：大黄 15.60g，黄连 7.80g，黄芩 7.80g，附子 7.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p>					

(八)柴胡桂枝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	桂枝（去皮）、黄芩一两半，人参一两半，甘草一两（炙），半夏二合半（洗），芍药一两半，大枣六枚（擘），生姜一两半（切），柴胡四	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品去皮	23.40g	上九味，以水 1400ml，煮取 600ml，去药渣，温服 200ml。	【功效】解表和里 【主治】伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦痛，微呕，心下支结，表证未解者。用于治疗防
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	23.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	23.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	23.40g		

<p>两。</p> <p>右九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。</p>	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	17.25g	<p>治癫痫，消化性溃疡，慢性胰腺炎，心律失常，上感发热及脂膜炎等症。</p>
	芍药（白芍）	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	23.40g	
	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	6 枚 (约 24.00g)	
	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	23.40g	
	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	生品	62.40g	
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，去滓，温服一升”，可知本方一次服用量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：桂枝 7.80g，黄芩 7.80g，人参 7.80g，甘草 7.80g，半夏 5.75g，芍药（白芍）7.80g，大枣 8.00g，生姜 7.80g，柴胡 20.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：柴胡桂枝汤药材包；柴胡桂枝汤丸（安徽省及养天下生物科技发展有限公司等）；柴胡桂枝汤药材粉末等。</p>				

(九)通脉四逆汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《伤寒论》 (汉·张仲景)	甘草二两(炙), 附子大者一枚(生用,去皮,破八片), 干姜三两。 右三味,以水三升, 煮取一升二合,去滓, 分温再服。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g	上三味,以水600ml,煮取220ml,去药渣,分两次温服。	【功效】破阴回阳,通达内外。 【主治】少阴病,阴盛格阳证。下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤,或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止,脉不出者。
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	1枚 (约30.00g)		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	46.80g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升二合,去滓,分温再服”,可知本方煎出总量为2次服量。故本方每次的服药量为:甘草15.60g,附子15.00g,干姜23.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议1-2次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡15.60克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家):通脉四逆汤药材包;通脉四逆汤丸(安徽泽宸倍健生物科技发展有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司等);通脉四逆汤膏(四川芝可兴生物科技发展有限公司等);通脉四逆汤浓缩颗粒(经方百草堂店等)。</p>						

(十)桂枝加厚朴杏子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲)	桂枝三两(去皮), 甘草二两(炙),	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品去皮	46.80g	上七味,以水1400ml,	【功效】解肌发表,降气平

景)	生姜三两（切），芍药三两，大枣十二枚（擘），厚朴二两（炙，去皮），杏仁五十枚（去皮尖）。右七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g	微火煮取600ml，去药渣，温服200ml，盖被子取微微出汗。	喘。 【主治】宿有喘病，又感风寒而见桂枝汤证者;或风寒表证误用下剂后，表证未解而微喘者。
生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	46.80g				
芍药(白芍)	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	46.80g				
大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12枚 (约 48.00g)				
厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	31.20g				
杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	燀苦杏仁	50枚 (约 15.00g)				
备注	<p>据原方中煎煮法“微火煮取三升，去滓，温服一升”，可知本方每次服用量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：桂枝 15.60g，甘草 10.40g，生姜 15.60g，芍药（白芍）15.60g，大枣 16.00g，厚朴 10.40g，杏仁 5.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：桂枝加厚朴杏子汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司等）；桂枝加厚朴杏子汤药材包；桂枝加厚朴杏子汤浓缩颗粒（百草经方缘店等）；桂枝加厚朴杏子汤丸（福建省聚华韵生物科技有限公司等）。</p>						

(十一)桂枝麻黄各半汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	桂枝一两十六铢（去皮），芍药、生姜（切）、甘草（炙）、麻黄（去节）各一两，大枣四枚（擘），杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及两仁者）。右七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品去皮	26.00g	上七味，以水1000ml，先煮麻黄沸腾一二遍，撇去浮沫，加入剩下药材，煮取360ml，去药渣，温服120ml。	【功效】解表散邪，小发其汗。 【主治】太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，一日二三度发，面色反有热色，无汗，身痒者。
		芍药(白芍)	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	15.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	15.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	15.60g		
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎	生品	15.60g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	4枚 (约16.00g)		

	杏仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.var.ansu Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	燿苦杏仁	24 枚 (约 7.20g)	
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升八合，去滓，温服六合”，可知本方每次服用量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：桂枝 8.67g，芍药（白芍）5.20g，生姜 5.20g，甘草 5.20g，麻黄 5.20g，大枣 5.33g，杏仁 2.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：桂枝麻黄各半汤丸（亳州宝丰生物科技有限公司、亳州本草芳堂饮品有限公司等）；桂枝麻黄各半汤药材包；桂枝麻黄各半汤茶包等。</p>				

(十二)小陷胸汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	黄连一两，半夏半升（洗），瓜蒌实大者一枚。 右三味，以水六升，	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	15.60g	上三味，以水 1200ml，先煮瓜蒌，取 600ml，去药	【功效】清热化痰，宽胸散结。 【主治】痰热

	先煮瓜蒌，取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g	渣，加入剩下药材，煮取400ml，去药渣，分三次温服。	互结之结胸证。胸脘痞闷，按之则痛，或心胸闷痛，或咳痰黄稠，舌红苔黄腻，脉滑数。
		瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果实	生品	30.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升，去滓，分温三服”，可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为：黄连5.20g，半夏11.50g，瓜蒌10.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：小陷胸汤药材包；小陷胸汤茶包；小陷胸汤丸（安徽万草堂生物科技有限公司等）。</p>						

(十三)柴胡桂枝干姜汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	柴胡半斤，桂枝三两（去皮），干姜二两，瓜蒌根四两，黄芩三两，牡蛎二两（熬），甘草二两（炙）。	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或 狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	生品	125.00g	上七味，以水2400ml，煮取1200ml，去药渣，再煎	【功效】和解散寒，生津敛阴。 【主治】伤寒少阳证，往来
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品去皮	46.80g		

	右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	31.20g	取 600ml，温服 200ml，日三服。	寒热，寒重热轻，神经官能症，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，心烦；牡疟寒多热少，或但寒不热。
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	生品	62.40g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	46.80g		
		牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳	煅牡蛎	31.20g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煎取三升，温服一升，日三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：柴胡 41.67g，桂枝 15.60g，干姜 10.40g，天花粉 20.80，黄芩 15.60g，牡蛎 10.40g，甘草 10.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：柴胡桂枝干姜汤药材包；柴胡桂枝干姜汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司、安徽省及养天下生物科技有限公司等）；柴胡桂枝干姜汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。</p>						

(十四)桂枝人参汤

基本信息	现代对应情况
------	--------

出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	桂枝四两（别切），甘草四两（炙），白术三两，人参三两，干姜三两。 右五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	62.40g	上五味，以水1800ml，先煮甘草、白术、人参、干姜四味，取1000ml，加入桂枝煮取600ml，去药渣，温服200ml，白日再服200ml，夜间服用200ml。	【功效】温补中气，解肌散邪。 【主治】太阳病，外证未除，而数下之，遂协热下利，利下不止，心下痞硬，表里不解者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	62.40g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	46.80g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	46.80g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服”，可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为：桂枝20.80g，甘草20.80g，白术15.60g，人参15.60g，干姜15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：桂枝人参汤药材包；桂枝人参汤丸（亳州市林兴堂药业科技有限公司、亳州市奈良家生物科技有限公司等）；桂枝人参汤茶包（亳州市林兴堂药业科技有限公司等）；桂枝人参汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。</p>						

(十五)生姜泻心汤

基本信息			现代对应情况				
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《伤寒论》（汉·张仲景）	生姜四两（切），甘草三两（炙），人参三两，干姜一两，黄芩三两，半夏半升（洗），黄连一两，大枣十二枚（擘）。右八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	62.40g	上八味，以水2000ml，煮取1200ml，去药渣，再煎取600ml，温服200ml，日三服。	【功效】和胃消痞，散结除水。 【主治】伤寒汗后，胃阳虚弱，水饮内停，心下痞硬，肠鸣下利；妊娠恶阻，噤口痢。现用于胃下垂、胃扩张、慢性胃炎等属胃阳虚弱，水饮内停者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	46.80g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	15.60g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	46.80g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	15.60g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12枚 (约48.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“再煎取三升，温服一升，日三服”，可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为：生姜20.80g，甘草15.60g，人参15.60g，干姜5.20g，黄芩15.60g，半夏11.50g，黄连5.20g，大枣16.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：生姜泻心汤浓缩颗粒（百草经方缘店、远志百草厅店等）；生姜泻心汤药材包；生姜泻心汤茶包（江阴天江药业有限公司等）；生姜泻心汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司等）；生姜泻心汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。</p>						

(十六) 栀子豉汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	栀子十四个（擘），香豉四合（绵裹）。右二味，以水四升，先煮栀子，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。	栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides Ellis</i> 的干燥成熟果实	生品	14 枚 (约 21.00g)	上二味，以水 800ml，先煮栀子取 500ml，加入纱布包裹的豆豉，煮取 300ml，去药渣，分为两份，温服 150ml 即呕吐后，不用服第二次。	【功效】清热除烦。 【主治】治发汗吐下后，余热郁于胸膈，身热懊憹，虚烦不得眠，胸脘痞闷，按之软而不痛，嘈杂似饥，但不欲食，舌质红，苔微黄，脉数。
		淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max (L.) Merr.</i> 的干燥成熟种子（黑豆）的发酵加工品	生品 纱布包裹	80ml (约 49.60g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升半，去滓，分为二服”，可知本方每次服用量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：栀子 10.50g，淡豆豉 24.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：栀子豉汤浓缩颗粒（安徽佳洪健康产业有限公司等）；栀子豉汤药材粉末（亳州宝丰生物科技有限公司等）；栀子豉汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司、亳州市林兴堂药业科技有限公司等）；栀子豉汤茶包；栀子豉汤药材包等。</p>						

(十七) 白虎加人参汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	知母六两，石膏一斤（碎），甘草二两（炙），粳米六合，人参三两。 右五味，以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，日三服。	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎	生品	93.60g	上五味，以水2000ml，煮至米熟，汤成去药渣，温服200ml，一日三服。	【功效】清热，益气，生津。 【主治】阳明热证气津两伤，大热，大汗，烦渴，脉大无力；以及暑病发热，津气两伤，症见汗出背微恶寒，身热而渴等。
		石膏	硫酸盐类矿物硬石膏族石膏 <i>Gypsum Fibrosum</i>	生品	250.00g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g		
		粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L.subsp. <i>japonica</i> Kato 的干燥成熟种仁	生品	120ml (约 96.00g)		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
备注	<p>据原方中煎煮法“温服一升，日三服”，可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为：知母31.20g，石膏83.33g，甘草10.40g，粳米32.00g，人参15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：白虎加人参汤药材包（亳州市普俊堂药业有限公司等）；白虎加人参汤茶包；白虎加人参汤丸（安徽泽宸倍健生物科技有限公司等）。</p>						

(十八)调胃承气汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	甘草二两（炙），芒硝半升，大黄四两（清酒洗）。右三味，切，以水三升，煮二物至一升，去滓，内芒硝，更上微火一二沸，温顿服之。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	31.20g	上三味，切碎，以水600ml，煮甘草、大黄至200ml水，去药渣，加入芒硝，用小火加热至沸腾1、2遍，一顿温服。	【功效】缓下热结。 【主治】治伤寒不恶寒但热，十余日过经谵语，当和胃气。阳明病胃肠燥热证。大便不通，口渴心烦，蒸蒸发热，或腹中胀满，或为谵语，舌苔正黄，脉滑数；以及胃肠热盛而致发斑吐衄，口齿咽喉肿痛等。
		芒硝	硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	生品	100ml (约 62.00g)		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	酒大黄	62.40g		
备注	<p>据原方中煎煮法“温顿服之”，可知本方煎出总量为1次服量。故本方每次的服药量为：甘草31.20g，芒硝62.00g，大黄62.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：调胃承气汤药材包（亳州市呦医堂药业有限公司等）；调胃承气汤丸（亳州市林兴堂药业科技有限公司、福建省聚华韵生物科技有限公司、山东康纳医药科技有限公司等）；调胃承气汤浓缩颗粒（百草经方缘店等）；调胃承气汤茶包等。</p>						

(十九)大黄黄连泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用	药味名	基原及用药部位	炮制规	折算剂	用法用	功能主治

	法	称		格	量	量	
《伤寒论》（汉·张仲景）	大黄二两，黄连一两。 右二味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	31.2g	上二味，以麻沸汤400ml浸渍，稍后绞去药渣，分为两顿温服。	【功效】泄热消痞。 【主治】治伤寒大下后，复发汗，心下痞，按之濡，其脉关上浮者，不可下，宜此药攻其痞。
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	15.6g		
备注	<p>据原方中煎煮法“分温再服”，可知本方煎出总量为2次服量。故本方每次的服药量为：大黄15.60g，黄连7.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-2次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：大黄黄连泻心汤茶包；大黄黄连泻心汤丸（亳州宝丰生物科技有限公司、福建省聚华韵生物科技有限公司等）；大黄黄连泻心汤药材包等。</p>						

(二十)桔梗汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《金匱要略》（汉·张仲景）	桔梗一两，甘草二两。 右二味，以水三升，煮取一升，分温再服。	桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A.DC.的干燥根	生品	15.60g	上二味，以水 600ml，煮取 200ml，分两顿温服。	【功效】宣肺止咳，祛痰排脓。 【主治】肺痈。咳而胸痛，振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升，分温再服”，可知本方煎出总量为 2 次服量。故本方每次的服药量为：桔梗 7.80g，甘草 15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：桔梗汤药材包；桔梗汤干燥生药颗粒（日本津村汉方株式会社等）；桔梗汤提取物颗粒（日本津村汉方株式会社、安徽佳洪健康产业有限公司等）。</p>						

(廿一)大黄附子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·	大黄三两，附子三枚（炮），细辛二	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf.	生品	46.80g	上三味，以水 1000ml，	【功效】温里散寒，通便止

张仲景)	两。 右三味，以水五升， 煮取二升，分温三 服。		或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根 及根茎			煮 取 400ml，分 三顿温服。	痛。 【主治】寒积 里实证。腹痛 便秘，胁下偏 痛，发热，手 足厥冷，舌苔 白腻，脉弦紧。
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	炮附片	3 枚 (约 45.00g)		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> <i>Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.</i> 、 汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> <i>Nakai</i> 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根 和根茎	生品	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升，分温三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：大黄 15.60g，附子 15.00g，细辛 10.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家)：大黄附子汤药材包；大黄附子汤代煎药物等。</p>						

(廿二)当归散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张仲景)	当归、黄芩、芍药、川芎各一斤，白术半斤。 右五味，杵为散，	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis (Oliv.) Diels</i> 的干燥根	生品	250g	散剂 上五味，研磨成粉末，以酒送服	【功效】养血安胎，清热调经。 【主治】妊娠血虚有热，症见胎
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis Georgi</i> 的干燥根	生品	250g		

酒饮服方寸匕，日再服。	芍药(白芍)	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	250g	1.00g，一日两次。	动不安，难产或月经先期腹痛，或产后虚弱、恶露不行，舌红、脉滑小数。
	川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	250g		
	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	125g		
备注	<p>据原方比例，一次送服 1.00g 的服药量为：当归 0.22g，黄芩 0.22g，芍药（白芍）0.22g，川芎 0.22g，白术 0.11g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一斤折算按汉代度量衡 15.60 克计算，一方寸匕按汉代度量衡折算约 2.7ml，一方寸匕草木药末按 1.00g 计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：当归散散剂（三槐堂店等）。</p>					

(廿三)防己黄芪汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	防己一两，甘草半两（炒），白术七钱半，黄芪一两一分（去芦）。右剉麻豆大，每抄五钱匕，生姜四片，	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S.Moore 的干燥根	生品	15.60g	煮散 防己、甘草、白术、黄芪剉磨成麻豆大小，每次用约 3.50g，加入 4	【功效】益气祛风，健脾利水。 【主治】风水或风湿。汗出恶风，
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	7.80g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	5.25g		

大枣一枚，水盞半，煎八分，去滓，温服，良久再服。	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	19.50g	片生姜, 1枚大枣, 加水 100ml, 煮取 80ml, 去药渣, 温服, 过一段时间再煮散服用。	身重浮肿, 关节烦疼, 自汗出, 腰以下重, 小便不利, 脉浮。
	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	4片		
	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	1枚		
备注	<p>据原方比例，一次送服 3.50g 的服药量为：防己 1.13g，甘草 0.57g，白术 0.38g，黄芪 1.41g，生姜 4 片，大枣 1 枚。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算，一钱匕约为一方寸匕的十之六七，本方剂中取汉代度量衡 1 钱=1 钱匕=0.70g 计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：防己黄芪汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司等）；防己黄芪汤茶包（北京同仁堂等）；防己黄芪汤药包（亳州上养制药有限公司等）；防己黄芪汤饮剂（药味有加减，香港同济大药房）。</p>					

(廿四)薏苡附子败酱散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《金匱要略》（汉·张仲景）	薏苡仁十分，附子二分，败酱五分。右三味，杵为末，取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服。	薏苡仁	禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi L.var.ma-yuen(Roman.) Stapf</i> 的干燥成熟种仁	生品	39.00g	煮散上三味，研磨成粉末，取 1.00g，以水 400ml，煎至 200ml，煎一顿服用。	【功效】排脓消肿。 【主治】肠痈内脓已成，身无热，肌肤甲错，腹皮急，按之濡，如肿状。
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii Debx.</i> 的子根的加工品	黑顺片	7.80g		
		败酱	败酱科植物黄花败酱 <i>Patrinia scabiosaefolia Fisch. Ex Trev.</i> 和 白花败酱 <i>Parinia villosa (Thunb.) Juss.[Valeriana villosa Thunb.]</i> 的全草	生品	19.50g		
备注	<p>据原方比例，一次送服 1g 的服药量为：薏苡仁 0.59g，附子 0.12g，败酱 0.30g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算，一分为 1/4 两按 3.90g 计算，一方寸匕按汉代度量衡折算约 2.7ml，一方寸匕草木药末按 1.00g 计算。）</p>						

(廿五)射干麻黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	射干十三枚、一云三两，麻黄四两，	射干	鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis (L.) DC.</i> 的干燥根茎	生品	13 枚或者一说 46.80g	上九味，以水 2400ml，	【功效】宣肺祛痰，下气止

张仲景)	生姜四两，细辛三两，紫菀三两，款冬花三两，五味子半升，大枣七枚，半夏大者八枚（洗）、一法半升。右九味，以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎	生品	62.40g	先煮麻黄沸腾两次，撇去浮沫，加入剩下药材，煮取600ml，分3次温服。	咳。 【主治】 痰饮郁结，气逆喘咳证，症见咳而上气，喉中有水鸡声，或胸膈满闷，或吐痰涎，苔白或腻，脉弦紧或沉紧。
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	62.40g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. <i>Schmidt</i> var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥花蕾	生品	46.80g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	生品	100ml (约38.00g)		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	7枚 (约28.00g)		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	大者8枚或 者一说 34.50g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升，分温三服”，可知本方煎出总量为3次服量。故本方每次的服药量为：射干4.3枚或者15.60g，麻黄20.80g，生姜20.80g，细辛15.60g，紫菀15.60g，款冬花15.60g，五味子12.67g，大枣9.33g，半夏2.7枚或者11.50g。根据张仲景方剂						

<p>服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：射干麻黄汤药材包（奇冠大药房旗舰店等）；射干麻黄汤浓缩颗粒（台湾汉方医药有限公司等）。</p>
--

(廿六)厚朴三物汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	厚朴八两，大黄四两，枳实五枚。右三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，内大黄，煮取三升，温服一升。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	124.80g	上三味，以水 2400ml，先煮厚朴、枳实取 1000ml，加入大黄煮取 600ml，温服 200ml。	【功效】行气除满，去积通便。 【主治】实热内积，气滞不行，腹部胀满疼痛，大便不通。
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	62.40g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck 的干燥幼果	生品	5 枚 (约 100.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，温服一升”，可知本方每次服用量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：厚朴 41.60g，大黄 20.80g，枳实 33.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p>						

产品形式（生产厂家）：厚朴三物汤药材包；厚朴三物汤茶包；厚朴三物汤丸（福建省聚华韵生物科技有限公司、亳州本草芳堂饮品有限公司、亳州市奈良家生物科技有限公司等）；厚朴三物汤膏（安徽国丰堂生物科技有限公司等）。

(廿七)葶苈大枣泻肺汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
泻肺汤《金匱要略》 (汉·张仲景)	葶苈（熬令黄色，捣丸如弹丸大），大枣十二枚。 右先以水三升，煮枣取二升，去枣，内葶苈，煮取一升，顿服。	葶苈子	十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl. 或独行菜 <i>Lepidium apetalum</i> Willd. 的干燥成熟种子	炒葶苈子	10.6ml (约 6.57g)	以水 600ml 先煮大枣，煮取 400ml 去枣，加入葶苈子煮取 200ml，一顿服用。	【功效】泻肺去痰，利水平喘。 【主治】主治痰涎壅盛，咳喘胸满不得卧；或心悸，面目浮肿，苔膩，脉弦滑。
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12 枚 (约 48.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升，顿服”，可知本方煎出总量为 1 次服量。故本方每次的服药量为：葶苈子 6.57g，大枣 48.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算，汉代一弹丸大按 10.6ml 计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：葶苈大枣泻肺汤药材包（滁州良辑贸易有限公司等）；葶苈大枣泻肺汤丸（亳州市林兴堂药业科技有限公司、亳州本草芳堂饮品有限公司等）；葶苈大枣泻肺汤膏（亳州市颐合生方营养食品有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司等）；葶苈大枣泻肺汤茶包等。</p>						

(廿八)小半夏加茯苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	半夏一升，生姜半斤，茯苓三两、一法四两。右三味，以水七升，煮取一升五合，分温再服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	生品	69.00g	上三味，以水 1400ml，煮取 300ml，分两顿温服。	【功效】和胃止呕、引水下行。 【主治】治停饮呕吐，心下痞闷，头眩心悸者。
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	125.00g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	46.80g 或者 62.40g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升五合，分温再服”，可知本方煎出总量为 2 次服量。故本方每次的服药量为：半夏 34.50g，生姜 62.50g，茯苓 23.40g 或 31.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：小半夏加茯苓汤药材包；小半夏加茯苓汤代煎药；小半夏加茯苓汤茶包等。</p>						

(廿九)泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用	药味名	基原及用药部位	炮制	折算	用法	功能主治

	法	称		规格	剂量	用量	
《金匱要略》（汉·张仲景）	大黄二两，黄连一两，黄芩一两。右三味，以水三升，煮取一升，顿服之。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	31.20g	上三味，以水600ml，煮取200ml，一服。	【功效】泻火解毒，燥湿泄热。 【主治】邪火内炽，迫血妄行，吐血，衄血，便秘溲赤；或湿热内蕴而成黄疸，胸痞烦热；三焦积热，眼目赤肿，口舌生疮，外证疮疡，心胸烦闷，大便秘结；湿热黄疸，胸中烦热痞满，舌苔黄腻，脉数实者。
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	15.60g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	15.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升，顿服之”，可知本方煎出总量为1次服量。故本方每次的服药量为：大黄31.20g，黄连15.60g，黄芩15.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡15.60克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：泻心汤药材包；泻心汤茶包；泻心汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司、安徽孙思邈药业有限公司、亳州绿之源生物科技有限公司等）。</p>						

(三十) 苓甘五味姜辛汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治

《金匱要略》（汉·张仲景）	茯苓四两，甘草三两，干姜三两，细辛三两，五味半升。右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三服。	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	62.40g	上五味，以水1600ml，煮取600ml，去药渣，温服100ml，一日三服。	【功效】温肺化饮。 【主治】寒饮咳嗽。咳痰量多，清稀色白，胸膈不快，舌苔白滑，脉弦滑等。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	46.80g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	46.80g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	生品	100ml (约 38.00g)		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，去滓，温服半升，日三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的 1/6。故本方每次的服药量为：茯苓 10.40g，甘草 7.80g，干姜 7.80g，细辛 7.80g，五味子 6.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：苓甘五味姜辛汤丸（山东康纳医药科技有限公司、亳州本草芳堂饮品有限公司等）；苓甘五味姜辛汤茶包（亳州市呦医堂药业有限公司等）；苓甘五味姜辛汤药材包（亳州市呦医堂药业有限公司等）；苓甘五味姜辛汤膏（亳州市颐合生方药养食品有限公司、安徽国丰堂生物科技有限公司等）；苓甘五味姜辛汤浓缩颗粒（百草经方缘店等）；苓甘五味姜辛汤药材粉末等。</p>						

(三十一)防己茯苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	防己三两，黄芪三两，桂枝三两，茯苓六两，甘草二两。右五味，以水六升，煮取二升，分温三服。	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S.Moore 的干燥根	生品	46.80g	上五味，以水 1200ml，煮取 400ml，分 3 顿温服。	【功效】益气健脾，温阳利水。 【主治】皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者。
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	46.80g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	46.80g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	93.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升，分温三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：防己 15.60g，黄芪 15.60g，桂枝 15.60g，茯苓 31.20g。甘草 10.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。)

产品形式(生产厂家):防己茯苓汤药材包;防己茯苓汤茶包(亳州市创鑫生物科技有限公司等)。

(三十二)越婢汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张仲景)	麻黄六两,石膏半斤,生姜三两,大枣十五枚,甘草二两。 右五味,以水六升,先煮麻黄,去上沫,内诸药,煮取三升,分温三服。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎	生品	93.60g	上五味,以水 1200ml,先煮麻黄,撇去浮沫,加入剩下药材,煮取 600ml,分 3 顿温服。	【功效】疏风解表,宣肺利水。 【主治】风水证,症见发热、恶风寒、一身悉肿、骨节疼痛;或身体反重而酸、汗自出;或目窠上微拥即眼睑水肿,如蚕新卧起伏、其颈脉动、按手足肿上陷而不起、脉浮或寸口脉沉滑。
		石膏	硫酸盐类矿物硬石膏族石膏 <i>Gypsum Fibrosum</i>	生品	124.80g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	46.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	15 枚 (约 60.00g)		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	31.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升,分温三服”,可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为:麻黄 31.20g,石膏 41.60g,生姜 15.60g,大枣 20.00g,甘草 10.40。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-3 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。)

产品形式(生产厂家):越婢汤药材包;越婢汤丸(安徽国丰堂生物科技有限公司、福建省聚华韵生物科技有限公司、亳州市林兴堂药业科技有限公司等);越婢汤浓缩颗粒(远志百草厅店、百草经方缘店等);越婢汤膏(安徽国丰堂生物科技有限公司等)。

(三十三) 栀子大黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张仲景)	栀子十四枚,大黄一两,枳实五枚,豉一升。 右四味,以水六升,煮取二升,分温三服。	栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides Ellis</i> 的干燥成熟果实	生品	14 枚 (约 14.00g)	上四味,以水 1200ml,煮取 400ml,分 3 次温服。	【功效】清热除烦,兼缓下。 【主治】酒黄疸。证见心中懊恼或热痛,胸腹痞满或便秘,苔黄或兼腻,脉数。
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum L.</i> 、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum Maxim.ex Balf.</i> 或药用大黄 <i>Rheum officinale Baill.</i> 的干燥根及根茎	生品	15.60g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium L.</i> 及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis Osbeck</i> 的干燥幼果	生品	5 枚 (约 100.00g)		
		淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max (L.) Merr.</i> 的干燥成熟种子(黑豆)的发酵加工品	生品	200ml (约 124.00g)		
备注	据原方中煎煮法“煮取二升,分温三服”,可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为:栀子 4.67g,大黄 5.20g,枳实 33.33g,淡豆豉 41.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-3 次,根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。)
 产品形式(生产厂家): 梔子大黄汤茶包; 梔子大黄汤丸(亳州市林兴堂药业科技有限公司等)。

(三十四)枳实芍药散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张仲景)	枳实(烧令黑,勿太过)、芍药等分。右二味,杵为散,服方寸匕,日三服。	枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥幼果	麸炒枳实	15.60g	散剂 上二味,研磨成粉末,每次服用 1.00g,一日 3 服。	【功效】调和气血之滞。 【主治】治产后腹痛,烦满不得卧;痈肿。
		芍药(赤芍)	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥根	生品	15.60g		
备注	<p>据原方比例,一次送服 1.00g 的服药量为:枳实 0.50g,芍药(赤芍) 0.50g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-3 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>(本栏信息,系按照经典名方总剂量除以服用次数,换算的一次煎煮剂量,一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算,一方寸匕按汉代度量衡折算约 2.7ml,一方寸匕草木药末按 1.00g 计算。)</p> <p>产品形式(生产厂家): 枳实芍药散(亳州市奈良家生物科技有限公司等); 枳实芍药散茶包(亳州市林兴堂药业科技有限公司等)。</p>						

(三十五)麻黄杏仁薏苡甘草汤

基本信息	现代对应情况
------	--------

出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	麻黄半两（去节，汤泡），甘草一两（炙），薏苡仁半两，杏仁十个（去皮尖，炒）。 右剉麻豆大，每服四钱匕，水盞半，煮八分，去滓，温服。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎	生品 用水浸泡	7.80g	煮散 上四味，剉磨成麻豆大小，每次取约 2.80g，加水 100ml，煮取 80ml，去药渣，温服。	【功效】发汗解表，祛风除湿。 【主治】风湿在表，湿郁化热证。一身尽疼，发热，日晡所剧者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	15.60g		
		薏苡仁	禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi</i> L.var.ma-yuen(Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁	生品	7.80g		
		杏仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.var.ansu Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	燀苦杏仁	10 枚 (约 3.00g)		
备注	<p>据原方比例，一次送服 2.80g 的服药量为：麻黄 0.65g，甘草 1.30g，薏苡仁 0.65g，杏仁 0.25g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算，一钱匕约为一方寸匕的十之六七，本方剂中取汉代度量衡 1 钱匕=0.70g 计算。）</p> <p>产品形式（生产厂家）：麻黄杏仁薏苡甘草汤丸（安徽国丰堂生物科技有限公司、阜阳健诺生物科技有限公司等）；麻黄杏仁薏苡甘草汤药材包；麻黄杏仁薏苡甘草汤茶包（安徽省曦文药业有限公司等）；麻黄杏仁薏苡甘草汤药材粉末（安徽望龙药业有限公司、亳州市华之堂生物科技有限公司等）。</p>						

(三十六)瓜蒌桂枝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	瓜蒌根二两，桂枝三两，芍药三两，甘草二两，生姜三两，大枣十二枚。右六味，以水九升，煮取三升，分温三服。	天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii Maxim.</i> 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii Harms</i> 的干燥根	生品	31.2g	上六味，以水1800ml，煮取600ml，分3次温服。	【功效】解肌祛邪，舒缓筋脉。 【主治】太阳柔痉体强证。症见项背强直，肢体拘急，发热，恶风寒，头痛汗出，苔薄白，脉沉细而迟或兼弦。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia Presl</i> 的干燥嫩枝	生品	46.8g		
		芍药（白芍）	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora Pall.</i> 的干燥根	生品	46.8g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis Fisch.</i> 的干燥根和根茎	生品	31.2g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale Rosc.</i> 的新鲜根茎	鲜品	46.8g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphusjuzuba Mill.</i> 的干燥成熟果实	生品	12 枚 (约 48.00g)		
		备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升，分温三服”，可知本方煎出总量为 3 次服量。故本方每次的服药量为：天花粉 10.40g，桂枝 15.60g，芍药（白芍）15.60g，甘草 10.40g，生姜 15.60g，大枣 16.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>（本栏信息，系按照经典名方总剂量除以服用次数，换算的一次煎煮剂量，一两折算按汉代度量衡 15.60 克计算。）</p>				